

Cálculo de variaciones :Algunos ejemplos. Ecuación de Jacobi

Antonio Lechuga Álvaro, Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos, Académico correspondiente de la RAMZ.

Resumen

El cálculo de variaciones es una herramienta matemática muy importante que ,en algunos casos,se emplea para resolver problemas en la naturaleza de contenido práctico e incluso teórico.Es por ello que presentamos algunos ejemplos sencillos resueltos completamente con la llamada teoría de Jacobi de los puntos conjugados.

1. Introducción

Para estudiar la segunda variación en el cálculo de variaciones una estrategia de las más completas es aplicar la llamada ecuación de Jacobi y determinar los puntos conjugados.Desde un punto de vista práctico vamos a aplicar el procedimiento a algunos casos que clarificarán e ilustrarán la potencia de la teoría de Jacobi y su extensión a otros campos afines. Comenzaremos con las trayectorias parabólicas de un cuerpo en el campo gravitatorio.

2. Trayectorias parabólicas

El problema variacional se expresa como,

$$I = \int_a^b \sqrt{(u^2 - 2gy)} \sqrt{(1 + y'^2)} dx$$

La solución es,

$$y = \operatorname{tag}(\alpha)x - \frac{g}{2u^2}(1 + \operatorname{tag}^2(\alpha))x^2$$

Esta es la solución que parte del origen de coordenadas con una velocidad , u , y ángulo α y pasa por un punto, $B(x_b, y_b)$

Aplicamos la teoría de Jacobi, calculando la envolvente de todas las trayectorias,que consiste en derivar la solución por α ,y eliminar α ,entre esta y la derivada, obteniendo,

$$y = \frac{u^2}{2g} - \frac{g}{2u^2}x^2$$

En general, para cada dos puntos A y B, hay dos parábolas que resuelven la ecuación de Euler y hay que usar la condición de Jacobi. Esta teoría dice que dado el punto inicial, A,tenemos que encontrar su punto conjugado. Este punto conjugado es precisamente el punto de tangencia de cada parábola con la envolvente calculada. Por tanto aquella parábola cuyo punto, B,se encuentre antes de tocar a la envolvente cumple la condición de mínimo. si el punto,B, se encuentra más allá de la tangencia , no la cumple. En otra palabras: El punto conjugado de uno de los extremos debe estar fuera del intervalo, AB.

3. Catenaria

El problema variacional de la catenaria se escribe como,

$$I = \int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} dx$$

La solución de la ecuación de Euler correspondiente es,

$$y = c \cosh\left(\frac{x-b}{c}\right)$$

En general en catenarias con la misma directrix hay dos soluciones de la ecuación de Euler que pasan por un mismo punto. En este caso las tangentes a las catenarias en los puntos conjugados se cortan en la directrix, por lo tanto la catenaria de mayor, c , cumple la condición de Jacobi.

Analíticamente la ecuación de Jacobi tiene como solución,

$$u = \sinh\left(\frac{a-x}{c}\right) - \left(\frac{x-a}{c}\right) \sinh\left(\frac{x-b}{c}\right) \sinh\left(\frac{a-b}{c}\right)$$

Sin olvidar que, u , no debe de tener otro cero salvo en los puntos de apoyo.

4. Pandeo en columnas esbeltas

En columnas esbeltas la disminución de la energía potencial,

$$U = P\sigma = Pl - \int_0^l \cos \varphi ds$$

, que ha de compensarse con la energía de flexión,

$$U_1 = \int_0^l \frac{EI}{2} \left(\frac{d\varphi}{ds}\right)^2 ds$$

Para pequeños valores de φ

$$\cos(\varphi) = 1 - \frac{1}{2}\varphi^2, \text{ y también, } ds \simeq dx$$

Obtenemos, por tanto,

$$I = \int_0^l (EI\varphi'^2 - P\varphi^2) dx$$

La ecuación de Euler se escribe,

$$\varphi'' + \alpha^2 \varphi = 0$$

$$\alpha = \frac{P}{EI}$$

La solución de esta ecuación diferencial, como sabemos es,

$$\varphi = C_1 \sin(\alpha x) + C_2 \cos(\alpha x)$$

La ecuación de Jacobi se expresa como,

$$F_{\varphi\varphi}u + F_{\varphi\varphi'}u' - \frac{d}{dx}(F_{\varphi\varphi'}u) - \frac{d}{dx}(F_{\varphi'\varphi'}u')$$

$$\text{En nuestro caso, } F_{\varphi'\varphi'} = 2EI, F_{\varphi\varphi} = -2P, F_{\varphi\varphi'} = 0$$

La ecuación de Jacobi es por tanto,


$$u'' + \alpha^2 u = 0$$

$$u = A \sin(\alpha x)$$

Ahora bien, el punto conjugado del origen es el siguiente cero de u . Para que no haya puntos conjugados a lo largo de l , ha de ser $l \leq \frac{\pi}{\alpha}$ o lo que es lo mismo,

$$\alpha^2 < \frac{\pi^2}{l^2}, \text{ luego } P < \frac{EI\pi^2}{l^2}$$

que es la carga crítica de Euler.



Register for free at <https://www.scipedia.com> to download the version without the watermark

5. Problema isoperimétrico

¿Cuál es la superficie de mayor área envuelta por una curva de longitud, $2L$, y el eje de las x entre los puntos 0 y $2a$?

La función variacional es,

$$I = \int_0^{2a} (y - \lambda \sqrt{1 + y'^2}) dx$$

La ecuación de Euler después de una primera integración es.

$$-\frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{x - c_1}{\lambda}$$

La solución es,

$$(x - c_1)^2 + (y - c_2)^2 = \lambda^2, \text{ es decir un arco de circunferencia.}$$

La ecuación de Jacobi se escribe,

$$F_{yy}u + F_{yy'}u' - \frac{d}{dx}(F_{yy'}u + F_{y'y'}u') = 0$$

$$\text{en donde } F_{yy} = 0, F_{yy'} = 0, y, F_{y'y'} = \frac{-\lambda y'}{\sqrt{1 + y'^2}}$$

$$\text{y es, } (x - a) \frac{du}{dx} = C$$

La solución de esta ecuación diferencial es,

$$u = C \ln\left(\frac{x - a}{a}\right)$$

En uno de los extremos, $u(2a) = 0$ y es un punto conjugado. sin embargo entre 0 y $2a$ no hay puntos conjugados con lo que estamos ante un máximo.

6. Líneas geodésicas

En una esfera, usando coordenadas esféricas,

$$x = R \cos \varphi \sin \theta$$

$$y = R \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = R \cos \theta$$

la función variacional que da la mínima distancia entre dos puntos se escribe,

$$I = R \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{1 + \sin^2 \theta \varphi'^2} d\theta$$

La solución de la ecuación de Euler correspondiente es,

$$\frac{\sin^2 \theta \varphi'}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta \varphi'^2}} = C_1$$

$$\varphi + \beta = \arccos\left(\frac{\tan \alpha}{\tan \theta}\right)$$

que es un arco de círculo máximo. La ecuación de Jacobi es,

$$F_{\varphi\varphi}u + F_{\varphi\varphi'}u' - \frac{d}{dx}(F_{\varphi\varphi}u) - \frac{d}{dx}(F_{\varphi'\varphi'}u') = 0$$

La solución se puede escribir como,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \beta}\right)_{\theta_0} - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \alpha}\right)_{\theta_0} \frac{\partial \varphi}{\partial \beta} = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\tan^2 \theta - \tan^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{\tan^2 \theta_0 - \tan^2 \alpha}}$$

que solo se cumple para $\theta = \theta_0 + n\pi$

Es decir, el punto conjugado del inicial se encuentra al otro lado del diámetro del círculo máximo, por lo que la geodésica es un mínimo solo si el arco es menor que un semicírculo.

7. Conclusión

La aplicación del cálculo de variaciones en estos ejemplos no presenta ninguna dificultad, sin embargo la comprobación de la estabilidad de las soluciones en su sentido más amplio es algo más complicada porque hay que considerar la segunda variación. Esta segunda variación es la que implica los puntos conjugados de Jacobi.

8. Referencias

- 1) Clegg J. C., Variationsrechnung, 1970 B.G.Teubner Stuttgart
- 2) Fox Charles, An Introduction to the Calculus of Variations, 1987 Dover Publications, Inc.
- 3) Krasnov M.L., Makarenko G.I., Kiseliov A.I., Cálculo Variacional, 1973 Editorial Mir Moscú
- 4) Lechuga A., Parabolic trajectories and Lie's contact transformations, 2019 Scipedia



The image shows a large, semi-transparent watermark of the word "SCIPEDIA" in a bold, sans-serif font. The letter "C" is highlighted in a bright yellow color, while the other letters are in a light gray. The watermark is positioned diagonally across the page, overlapping the reference list.

Register for free at <https://www.scipedia.com> to download the version without the watermark